



Bioestrovet

Prostaglandin F_{2α}



Bioestrovet

Prostaglandin F2 α



İNEKLERDE

KULLANIM SAHASI


- Östrus senkronizasyonu
- Östrusun tetiklenmesi
- Suböstrus (gizli kızgınlık)
- Kalıcı korpus luteum
- Kronik metritis ve pyometra
- Luteolitik ovaryum kistlerinin tedavisi
- Foliküler kistlerin kombine tedavisi
- İstenmeyen ya da patolojik gebeliklerde abort
- Doğumun başlatılması
- Doğumdan sonra metropati ve uterus involüsyonu
- Doğum ya da çiftleşme sonrası anöstrus
- Erken embriyo transfer uygulamalarında verici ve alıcıların seksüel sikluslarının senkronizasyonu

KULLANIM ŞEKLİ

2 ml Bioestrovet tek veya tekrarlı dozları kas içi enjeksiyonla uygulanır.

İneklerde östrus senkronizasyonu

- Luteal fazdaki ineklere
- 2 ml BİOESTROVET (0,5 mg)/inek
- 72 saat sonra rektal muayene ve tohumlama
- Ya da 11 gün ara ile 2 enjeksiyon



0,25 mg/ml KLOPROSTENOL

KISRAKLARDA

KULLANIM SAHASI

- Fötüsün erken ölümlerinde luteolizisin indüksiyonu
- Kısraklarda tip 1 yalancı gebeliği sonlandırmak
- Kalıcı korpus luteum fazını sonlandırma
- Kısır ve laktasyondaki kısraklarda kızgınlığın tetiklenmesi
- Uterus yangısının tedavisi
- Doğumun başlatılması

KULLANIM ŞEKLİ

400 kg'a kadar 0,5-1 ml (0,125-0,25 mg kloprostenol), 400 kg'ın üzerindekiilere ise 1-2 ml (0,25-0,5 mg kloprostenol) Bioestrovet amaca göre kas içi tek veya tekrarlı doz şeklinde uygulanır. Tohumlama için en uygun periyot, uygulamadan sonra 4-6 gün arasındır.



Novakim ilaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.

GEPOSB Cumhuriyet Cd. No: 3 Gebze / Kocaeli 41400 Tel: 0 (262) 751 06 74 Faks: 0 (262) 751 06 73

www.novakim.com - novakim@novakim.com