





# Fercobsang®

Maksimum Et Verimini Hedefleyenlere!





### Kullanım Şekli:

- Ayda 1 kez, 3-5 gün süre ile art arda IM, SC veya oral yol\* ile uygulanır.
- \* Sütle beslenen hayvanlarda Demir'in bağlanmaması için, beslenmeden en az 2-3 saat sonra uygulanmalıdır.
- Özellikle kuzu, oğlak ve buzağılara ilk uygulama 10-15 günlükken yapılır ve daha sonra ayda 1 kez tekrarlanması önerilir.
- Besi amacıyla beslenen hayvanlara da yine aynı şekilde ayda 1 kez 3-5 gün art arda uygulanmalıdır.
- Süt hayvanlarında ise özellikle güç doğum, stres ve operasyon sonrası gibi durumlarda görülen hemorajik anemilerde 3-5 gün süreyle uygulanmalıdır.
- Kedi ve köpeklerde anemik olgularda 3-5 gün süreyle uygulanmalıdır.

### Türlere göre uygulama yolları ve dozu:

At – Sığır:	IM, SC, Oral
Genç: 10 ml	
Erişkin: 20 ml	
Koyun – Keçi:	IM, SC, Oral
Genç: 1-2 ml	
Erişkin: 5 ml	
Köpek – Kedi:	Sadece Oral
Her kg canlı ağırlık için 1-2 damla	

**Demir preparatlarının Tetrasiklin ve Bakır preparatlarıyla beraber kullanımı kontrendikedir!**

**Deri altı kullanımı olan tek demir preparatı!**



- \* Hızlı ve kolay enjeksiyon
- \* Aktif maddelerin hızlı emilimi ve plazma/dokulara hızlı dağılımı

FERCOBSANG: Enjeksiyonluk ve oral çözelti BİLEŞİMİ: 1 ml'sinde 10 mg demir amonyum sülfat (2 mg aktif demir), 0.025 mg Vitamin B12 (siyanokobalamin), 20 mg Vitamin PP (nikotinamid) ve 0.05 mg kobalt glukonat (0.0065 mg aktif kobalt) içerir.  
Detaylı bilgi için firmamıza başvurunuz.



Novakim İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş.  
İnönü GEPOSB Mah. 32. Sok. No: 2, Gebze – 41400 / Kocaeli  
[www.novakim.com](http://www.novakim.com) / [novakim@novakim.com](mailto:novakim@novakim.com)