

Ornipural®

SIĞIR VE KOYUNLAR İÇİN KARACİĞER KORUYUCUSU, LİPOFİLİK, DİÜRETİK

BİLEŞİMİ(1 ml'de)

| | |
|---------------|----------|
| Betain | 15,0 mg |
| L- Arginin | 33,3 mg |
| L- Ornithin | 11,8 mg |
| L- Citrulline | 10,0 mg |
| Sorbitol | 200,0 mg |

KULLANIM ALANLARI

- Karaciğer yetmezliği
- Hepato-nefrit
- Hiperammonemia
- Sindirim güçlüğü ve iştahsızlık
- Metabolik bozukluklar (Hipokalsemi, tetani, asetonemi, gebelik toksemisi)
- Koprostasis (peklük)
- Zehirlenmeler
- Aşırı beslenme

KULLANILAN HAYVAN TÜRLERİ

Siğır ve koyun

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Kas içi, deri altı ve yavaş damar içi yolla iki gün ara ile 1-5 kez uygulanabilir.

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Siğırlara | 50-100 ml |
| Buzağılara | 1 ml (her 5-10 kg canlı ağırlık için) |
| Koyunlara | 10-15 ml |
| Kuzulara | 3-5 ml |

KALINTI ARINMA SÜRESİ

Et : 0 gün
Süt : 0 gün

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Ornipural'ın aktif bileşenleri karaciğer koruyucu, lipofilik ve diüretik özelliklere sahiptir.

Sorbitol başta B12, B6 ve demir iyonu olmak üzere birçok vitaminin bağırsak emilimini artırır. Aynı zamanda bir besin maddesi olup detoksifiye edici ve diüretik etkilidir. Ozmotik laksatif özellikleriyle bağırsaklarda geçişi artırır. Safra söktürücü etkiye de sahiptir.

Betain lipofilik özelliğe sahiptir. Yağlı karaciğer sendromunu (lipoprotein sentezi) ve karaciğerde aşırı yağ birikimini önler.

L-Ornithin ve **L-Citrulline** üre siklusunu aktive ederek organizmanın detoksifikasyonunda ve amonyum eliminasyonunun artırılmasında kullanılan aminoasitlerdir.

L-Arginin önemli metabolik mekanizmaların ve enzimatik reaksiyonların bir parçası olan esansiyel aminoasitlerdir (trikarboksilik asit siklusu, üre siklusu...).



Novakim İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş.

Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi, Cumhuriyet Caddesi No:3 Gebze 41400 KOCAELİ
Tel: 0262 751 06 74 Faks: 0262 751 06 73 www.novakim.com