



Tolfine®

Non-steroidal
Anti-inflamatuvar (NSAID)

Yangı
kontrol
altında

Antipiretik

Anti inflamatuvar

Antitoksik



Analjezik



 NOVAKIM

 Tolfine®
BRD


Tolfine®



Siğirilar için en etkili NSAID

Antipiretik

Anti inflamatuvar



Antitoksik

Analjezik

Etkinliđi kanıtlanmıř (yayınlarla) en etkili NSAID

- BRD (Siğirilar da solunum sistemi enfeksiyonu)
- Akut mastitis
- Buzađilar da omphalectomy operasyonundan sonra
- Buzađilar da arthritis
- Süt siğirilarında lameness

TOLFINE®: enjeksiyonluk çözeltili. BİLEřİMİ: Tolfenamic asit 4 g, sodyum formaldehit sulfoksilat 0.50 g, benzil alkol 1.04 g. Tařıyıcı: qs 100 ml. ENDİKASYONLARI: Siğirilar da non steroid anti-inflamatuvar. KONTRAENDİKASYONLARI: Yok. Doz: IM: 1ml/10 kg 48 saat ara ile IV: 1 ml/20 kg 24 saat arayla yada 24 saat sonra IM enjeksiyon. Arka arkaya 5 enjeksiyonu geçmemeli. Arınma süresi: Süt 1 gün (2 sađım) Et: 12 gün. SATIř YERİ VE řARTLARI: Sadece Veteriner hekim reçetesi (VHR) satılır.

 Vétoquinol *a Sign of Passion*

 novakim

Novakim İlaç ve Kimya San. Tic. A.ř. Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi, Cumhuriyet Caddesi No:1 Gebze 41400 KOCAELİ
Tel: 0262 751 06 74 Faks: 0262 751 06 73 www.novakim.com